

PREPARATION A LA MISE BAS

LA RÉUSSITE DE LA MISE BAS REPOSE SUR DES ACTIONS DE PRÉVENTION

La fin de gestation chez les brebis/chèvres est l'étape clef de la future campagne laitière, elle va déterminer :

- La production laitière de la mère ☐
- Le poids et la croissance des nouveaux-nés☐ ainsi que la viabilité et la vigueur

FOCUS ALIMENTATION EN FIN DE GESTATION

Le développement du fœtus accroît les besoins alimentaires de la mère

Il est important de fournir à la mère durant cette période une alimentation riche en énergie et en matières azotées mais aussi moins encombrante. Il faut donc des fourrages de très bonne qualité et des aliments concentrés.

Une sous alimentation aurait des conséquences néfastes sur l'état de la mère à la mise-bas (avec risque de toxémie), sur le poids des nouveaux nés ainsi que sur les principaux critères de performance comme la vitesse de croissance.

PRECAUTIONS POUR BIEN PRÉPARER LA MISE-BAS

- Changement de régime alimentaire de manière progressive (sur 10/15 jours). ☐
- L'eau doit être accessible et en quantité suffisante ☐
- Apport de complément minéral riche en phosphore et en calcium ☐
- En fin de gestation, manipuler les mères avec précaution pour éviter tout risque d'avortement
- La descente d'estive devrait se dérouler au plus tard 6 semaines avant la mise-bas
- Il est préférable d'installer les femelles gestantes dans une bergerie propre et préalablement désinfectée par un produit à large spectre.

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER LA MISE-BAS

- **3 à 6 semaines avant la lutte** : si besoin, réalisez les vaccinations contre les principales maladies abortives.
- **3 à 6 semaines avant la mise-bas** : si besoin, réalisez les vaccinations contre l'entérotoxémie.
- **avant la mise-bas** : réalisez des coproscopies un mois avant la mise-bas afin de faire les traitements antiparasitaires adéquats dans les 15 jours précédents la mise-bas.
Réalisez un dernier traitement antiparasitaire externe
- **avant le début de traite** : réalisez l'entretien et la révision de la machine à traire.



LES AVORTEMENTS

En cas d'avortement, la visite du vétérinaire sanitaire est OBLIGATOIRE et GRATUITE.

LA TOXEMIE DE GESTATION

Maladie spécifique fin de gestation

Apparaît si les besoins alimentaires ne sont pas assez couverts durant les dernières semaines de la gestation. La mère utilise alors ses réserves adipeuses formant des corps cétoniques toxiques s'accumulant dans l'organisme.

Symptômes: perte l'appétit, ne rumine plus, difficulté à se déplacer, troubles de la vue et l'haleine dégage une odeur de pomme ou d'acétone.

Faire appel à son vétérinaire.